Informationen - Ameisenfutter

– Schrauben Sie den Schraubverschluss des Ameisenfutter Röhrchens im Uhrzeigersinn auf
– Je nach Ameisenart kann es sein, dass das Pulver nicht angenommen wird. Wenn Sie dies feststellen, feuchten Sie es mit einem Tropfen Wasser an, z.B. mit Hilfe einer Pipette
– Das Ameisenfutter sollte bei Proteinfutter nach drei Tagen entfernt bzw.ausgetauscht werden.
– Kohlenhydrat-, Honig- und Körnermischungen können je nach Höhe der Luftfeuchtigkeit bis zu einer Woche verwendet werden
– Je nach Koloniegröße eine entsprechende Futtermenge in einen beliebigen Futternapf geben (z.B. mit einem "Mikro Spatellöffel 150mm lang" , "Löffelspatel 150mm lang")
– Proteinfutter sollte nach zwei Tagen entfernt bzw. ausgetauscht und der Napf gereinigt werden
– Kohlenhydrat-, Honig- und Körnermischungen können je nach Höhe der Luftfeuchtigkeit zwischen drei bis fünf Tage im Napf verbleiben (siehe Detailbeschreibung)

Inhaltsangaben:

Abkürzungen und Inhalt (alle Röhrchen sind mit einem Volumen von 2ml befüllt).

PP = Proteinfutter
PI = Proteinfutter FD (freeze-dried) Insekten
K = Kohlenhydratfutter
F = Fruchtfutter
ZH = Zuckerhoniglösung
ZU = Zuckerlösung
WI = Wiesenhonig
WA = Waldhonig
WÜ = Wüstenhonig
RE = Regenwaldhonig
BL = Blütenpollen
MI = Körnerfutter Minor
ME = Körnerfutter Media
MA = Körnerfutter Major

Verwendung / Anwendung:

Proteinfutter = für insektenfressende Ameisenarten (Eulipotyphla)
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)
Es sollte mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand nur 1 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.
Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Proteinfutter FD = für insektenfressende Ameisenarten (Eulipotyphla)

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)
Es sollte mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand nur 1 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.
Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Kohlenhydratfutter = für Zucker/Honig fressende Ameisenarten
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)
Es kann mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand 3 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.
Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Fruchtfutter = für Früchte fressende Ameisenarten (Frugivoren)
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)
Es kann mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand 3 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.
Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Zucker-Honiglösung = für Zucker/Honig fressende Ameisenarten
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)
Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Da sich durch die Luftfeuchtigkeit die Zuckerkonzentration verringert und ein Gärungsprozess beginnt, sollte das Futter alle 3 Tage ausgetauscht werden. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen. Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Zuckerlösung = für Zucker fressende Ameisenarten
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)
Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Es ist so lange verwendbar, bis der Zucker eingetrocknet ist. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen. Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Wiesenhonig
Waldhonig
Wüstenhonig
Regenwaldhonig = für Honig fressende Ameisenarten (Meliphagidae)
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)
Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Da sich durch die Luftfeuchtigkeit die Zuckerkonzentration verringert und ein Gärungsprozess beginnt, sollte das Futter alle 3 Tage ausgetauscht werden. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen. Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Blütenpollen = für Blütenpollen fressende Ameisenarten
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)
Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Da durch die Luftfeuchtigkeit die Konsistenz aufweicht, sollte das Futter alle 5 Tage ausgetauscht werden. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.
Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Körnerfutter Minor

Körnerfutter Media
Körnerfutter Major = für körnerfressende Ameisenarten = (Granivoren)
Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)
Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Der Futternapf /-röhrchen sollte an einem trockenen Ort platziert werden. Im feuchten Zustand, können die Körner (Samen) anfangen zu keimen. Wenn dieses bemerkt wird, sollte das Futter gewechselt werden. Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Lagerung der Futtermittel allgemein.
Um die Qualität der Futtermittel zu gewährleisten, sollten alle Futtermittel dunkel und trocken gelagert werden.

Informationshotline zum Futtermittel +49 30 76687051 (Mo. - Fr. 9:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00

Uhr) Kennnummer des Loses und mind. haltbar bis (MHD) entnehmen Sie bitte der

Packungsbeilage.

Zuständige Veterinär- und Lebensmittelaufsicht:
Veterinäramt Steglitz
Königin-Luise-Str. 92
14195 Berlin